

急救 – 蛇毒.蜂毒的急救法

分類：急救與安全 · 作者：陳志南

一、蛇毒.蜂毒的急救法

1.毒蛇咬傷：

1. 毒蛇咬傷的預防：

- 1. 切勿招惹毒蛇：毒蛇大都不會主動襲擊人類；因此發現毒蛇的時候，絕對不要招惹它，以防攻擊。
- 2. 配備防蛇裝備：毒蛇咬傷大多發生在前臂或下肢，尤其是在手指、腳趾附近。所以登山郊遊穿長靴和長褲，並戴手套，是最簡易的預防措施。
- 3. 消除蛇類棲息的場所：家屋附近的竹林、草叢、洞穴等，應經常整理清除，俾使蛇類無法藏身。
- 4. 避免逗留徘徊戶外：夜間、日出及雨過天晴，為蛇類最活躍的時間。

2. 毒蛇咬傷的緊急處理：

- 1. 保持鎮靜，儘可能辨別蛇類。
- 2. 如四肢被咬傷，應即刻在咬傷部位的近心端處，用手巾、布條等紮緊，以阻止血行，防止毒液擴散。
- 3. 紮緊後，可在咬傷處，用手指擠壓，使毒液隨血流出體外。
- 4. 局部冷敷，詳記咬痕及病人的症狀。
- 5. 傷者及受傷部位，儘量減少活動，並讓傷口的位置低於心臟。
- 6. 即刻安排送醫，各山地衛生所及省縣立醫院，均備有抗毒蛇血清，破傷風疫苗。
- 7. 切勿輕信巫術或秘方，以免耽誤治療時機，導致危及生命。

表一：毒蛇種類

出血性	神經性	混合性
響尾蛇科 百步蛇 龜殼花 赤尾青竹絲	蝙蝠蛇科 飯匙倩 (眼鏡蛇) 雨傘節	蝮蛇科 鎖鍊蛇

※神經性毒蛇咬傷傷口疼痛較輕，往往只有些許麻感，又神經毒吸收速度比較快，但卻因潛伏期較長，常令人產生掉以輕心而不及時注意處理，故危險性較大。

2.昆蟲及動物咬傷：

3. 獸咬：

- 1. 立刻用水清洗傷口，沖掉唾液。
- 2. 再用肥皂和水洗滌傷口五分鐘，徹底沖洗。
- 3. 用紗布或乾淨布塊包紮。
- 4. 設法捉住牠，再觀察是否有狂犬病徵象。
- 5. 儘速送醫接受狂犬病血清或破傷風類毒素預防注射。

4. 蟲咬：

1. 用肥皂和水清洗患處。
2. 如患處發腫，用冰水浸透的布蓋在患處。
3. 送醫。

5. 螫傷：

毒蜘蛛、蠍子、蜈蚣螫傷處四周可能紅腫，加上腹部或肌肉痙攣難受、發燒、出汗、噁心、刺痛或灼痛，可能蔓延全身。

處理：

1. 保暖
2. 在螫傷處冰敷使毒素散的慢
3. 送醫

6. 蜂類螫傷：

1. 用消毒的針或小刀挑出螫刺。
2. 冰敷，患處可塗氨水。
3. 全身螫傷者浸入小蘇打的冰水中。
4. 送醫。