

急救 – 包紮技術

分類：急救與安全 · 作者：陳志南

一、包紮技術

在處理完傷口之後，因應傷口的狀況，一般而言都需要為傷口覆蓋一層敷料，有時，因為骨折發生，或是為了預防傷口再度出血，這時就需要使用到包紮的技巧了。一般而言，包紮具有下列幾個目的：

1. 固定敷料、夾板及受傷部位。
2. 保護傷口，減少感染及再受傷。
3. 支托傷部，使傷部感到舒適安全。
4. 局部加壓，幫助止血，也可以預防或減輕局部的腫脹。
5. 矯正身體某一部份的畸形。
6. 保暖。

而在包紮的材料選擇上，一般可分為：敷布、繃帶、三角巾，以下我們將為大家簡單介紹各種包紮方式。

（一）敷布

敷布或壓布是掩蓋傷處的覆蓋物，它的目的在協助控制傷處出血，吸收其分泌物。並避免細菌感染。由於敷布直接覆蓋傷口，因此需要消毒。消毒過的敷布(如紗布與繃帶)都是個別包裝的，大部份的藥店都買得到。如果買不到消毒的敷布，清潔的、剛熨過的手帕、枕頭套、被單或棉布，都可以替代(熨斗的熱可以殺菌)。

如果時間允許，一塊布在熱水中煮15分鐘，然後弄乾就可以當消毒敷布用。膠帶與會起毛的材料(如脫脂棉)絕不可直接施用在傷口上，因為它會黏在傷口上，難以撕開。


敷布必須大到超過傷口各邊 2~3 公分，以免傷口任何一部份感染。貼用敷布的方法是在傷口正上方張開，然後下降貼上。不要在皮膚上拉扯敷布，這樣會污染敷布。變形、走了樣的敷布在上繃帶前即應拋棄。

（二）三角巾包紮

1. 規格與材質

布料對摺為三角形，沿對角線剪成二塊三角巾，可為棉布、麻布，需柔軟、堅固、無縫邊，它也可當作寬窄繃帶使用，及作環形布墊使用。

2. 使用形式




可將三角巾摺成不同形式使用。

3. 使用時應注意事項


1. 包紮後，使用平結法打結。
2. 不可在頸後，鎖骨上面打結，其他與捲軸繃帶相同。
3. 懸掛手臂應使其肘關節略曲向上，手腕不可下垂。

4. 各種包紮法


1. 頭部包紮法（使用全巾）：
用於頭部外傷時。




2. 額頭包紮法（使用窄帶）：
用於額頭外傷時。




3. 額部及耳部包紮法（使用窄帶）：
用於額部或耳部外傷時，如圖。




4. 胸部或背部包紮法（使用全巾）：
用於胸部或背部外傷時，三角巾頂點需置於傷側，如圖。




5. 托臂包紮法（使用全巾）：
用於臂部外傷時，如右手臂受傷則以三角巾包紮，三角巾之等腰頂點需能綁著托住手肘，手臂需置略高於水平面，如圖。




6. 手掌包紮法（使用窄摺帶）：
用於手掌部外傷時，如圖。







7. 全手掌包紮法（使用全巾）：
用於手掌部外傷時，如圖。



8. 手掌部壓迫包紮（使用寬摺帶）：
用於手掌部外傷並需壓迫止血時包紮，如圖。



A




B




C



D



A



B



C





D





9. 肘及膝部包紮（使用寬帶）：

用於肘及膝部外傷時，如圖。


肘部：




膝部：




10. 肩部及上臂部包紮法（使用全巾、窄帶各一）：
用於肩部及上臂部外傷時，如圖。



11. 臀部包紮法（使用全巾、窄帶各一）：
用於臀部外傷時，如圖。



12. 足關節包紮（使用窄帶）：
用於足部外傷時，如圖。



(三) 繃帶包紮

繃帶是固定敷布或夾板的材料，它亦可做包纏之用，比如彈性繃帶。它可直接施用於傷口以減少出血、紅腫，或是用來支持關節或肌肉。

要適當發揮功能，繃帶應穩當施用，不要大緊。太緊會使血液不能循環，造成嚴重的組織壞死。彈性繃帶施用恰當的話，效用很好，不過它也特別危險，因為通常急救者會弄得太緊——不要忘了，傷口可能會腫大，而使原先平整的繃帶繃緊。

當我們包紮手臂、手、腿或腳時，要露出手指或腳趾，這樣紅腫、青腫或蒼白、發冷等信號，都可以觀察或感知到。如果上列現象出現或病患抱怨麻木、刺痛，應該馬上放鬆繃帶。

1. 規格與材質

1. 長方形繃帶

長方形繃帶可用來包紮簡單的割傷和擦傷，這類繃帶很容易在一般藥店買到。它是一種敷布與繃帶的混合型產品，為防止污染，施用時不要去摸消毒過的紗布。

2. 紗布繃帶

這是以往常用的繃帶，主要是由紗布所做成，有不同寬度與尺寸，可以用在身體上大部分區域。如果買不到繃帶時，也可以用乾淨的布條取代。

3. 彈性繃帶


與繃帶的作用相同，但是繃帶材質本身具有伸縮特質，因此，在包紮的過程中更便於適應身體起伏的幅度，更可以貼近身體而不易掉落。

4. 網狀繃帶

網狀繃帶在設計時已經針對身體不同部位做了區分，因此，免除了許多人對於包紮的恐懼感，只要選對部位，剪下適當的長度及可以達到包紮的功能。

2. 收藏

繃帶的收藏方法相當簡單，只需要將使用過的繃帶洗淨、消毒之後，依原來形狀捲回即可。



3. 包紮基本原則


1. 包紮時，不可以讓繃帶掉落地面，這樣會污染繃帶。
2. 包紮之前，應該先將雙手洗淨。
3. 手握繃帶實應注意握的方向（如右圖），以使操作過程更加順利。
4. 繃帶包紮結束之後，與三角金包紮相同，皆以平結作為結束。
5. 在結束包紮時，如果繃帶不夠長，則可以將繃帶從中間剪開，直接包住肢體，再做平結結束。
6. 每次包紮時要覆蓋住前一圈的 $\frac{2}{3}$ ~ $\frac{3}{4}$ 。

4. 各種包紮技術

1. 環狀包紮


用於定帶（固定）或結帶（結束），及包紮粗細相同部位。

1. 捲軸繃帶展開之一端為帶端 a，另一端為捲軸 b，包紮時右手緊握捲軸，左手提帶端，繃帶外面貼附患者包紮部位。



2. 包紮時先固定繃帶，

1. 使帶端斜置包紮部位之下方，把繃帶環紮，
2. 繞一圈後將斜出之一角露出
3. 再把斜出部份下折
4. 環紮二至三圈。



3. 包紮完畢可用下列方法固定：


1. 用膠布或安全別針固定之。
2. 以繃帶留適當長度剪開再打平結。（如圖一）
3. 如果繃帶長度足夠則可以將繃帶反折之後再打平結。（如圖二）

4. 包紮完畢固定時須注意：

1. 不可在受傷面或炎症部位打結。
2. 不可在關節面或骨突處打結。
3. 不可在受壓部位或肢體內側打結。
4. 不可在常磨擦處打結。


圖一

圖二




- 螺旋包紮

用於粗細相同肢體。




- 反螺旋包紮

用於細長或粗細不同肢體。




- 八字型包紮

多用於固定關節敷料。





- 人字形包紮法

多用於包紮手掌、足掌部位。



- 指尖包紮

指尖
受傷



手指
受傷

